



Tortinegra - de - barrete

Trata-se de uma das mais abundantes

tortinegras da nossa avifauna.

Apresenta a cabeça preta, no caso dos machos, garganta branca e um visível anel orbital avermelhado. As fêmeas são mais acastanhadas na cabeça e menos escuras no dorso. A cauda é ligeiramente comprida, facto mais notado quando esta ave se desloca em voo.

Esta espécie existe especialmente no Norte do país, o seu canto melodioso é um dos sons mais característicos dos parques e jardins urbanos.

Barrete preto nos machos e castanho nas fêmeas.

Tortinegra - de - barrete





Tentilha
muito comum em ga-
lorestas, costuma al-
e no solo, principal-
mente. Os outros
incluem forma gran-
dando, com outros
fringilidos e canários.
Constituída por 13 espécies
as áreas desta família
são essencialmente
granivoras.

Tentilhão

Muito comum em zonas florestais, costuma alimentar-se no solo, principalmente de sementes.

No outono e inverno forma grandes bandos com outros fringídeos, (família de aves constituída por 138 espécies. As aves desta família são essencialmente granívoras).


Tentilhão




Toutinere de - barrete



Le
ar
ma
orl
aca
doss
mais
Esti
de fait
mais Co
barrete f



Andorinhão preto



Andorinhão - preto

Tem um comprimento entre 17-18 cm e é abundante em zonas urbanas, sendo frequentemente em pequenos bandos.

As diferentes espécies de andorinhas têm cores diferentes, mas regra geral são muito bonitas e vistosas.

Têm um corpo esguio e aerodinâmico com asas longas e pontiagudas que lhes permitem fazer manobras aéreas extraordinárias para caçarem as presas, quer por meio de longos mergulhos durante as migrações das andorinhas são grandes relatórios da tamanho da sua espécie a sua vista apurada. As andorinhas têm bicos e mandíbulas fortes e uma boca muito longa.

Com quem vivem as andorinhas? Algumas vivem solitárias, mas costumam-se em bando. Juntam-se para criar locais para passar a noite.

Construem ninhos em colônias de muitas andorinhas.

As andorinhas vivem entre 3/8 ou 11 anos. Alimentam-se de insetos, frutos ou sementes. Bebem água durante o dia.

Andorinhão - preto



Andorinhão - preto

Com um comprimento entre

17 - 18.5 cm, é uma ave abundante em zonas urbanas, é observado frequentemente em pequenos bandos estridentes.

As diferentes espécies de andorinhas têm formas e cores diferentes, mas regra geral são aves muito bonitas e vistosas. Possuem um corpo esguio aerodinâmico, com asas longas e pontiagudas que lhes permitem fazer manobras aéreas extraordinárias, quer para sacarem as presas, quer para realizarem

Com quem vivem as andorinhas?

o-Tentilhão



o Tentilhão

Muito comum em zonas florestais. Costuma alimentar-se no solo, principalmente de semente.

No outono e inverno forma grandes bandos com outros fringídeos. Família de aves constituída por 138 espécies. As aves desta família são essencialmente granívoras.

Toutinegra-de-barrete



Toutinegra-de-barrete trata-se de um das abundantes toutinegras avifauna. Apresenta a cor no corpo do macho garganta e um visível orelhão avermelhado. As fêmeas mais acastanhadas na cabeça, menos escuras no dorso. cauda e ligeiramente compacto mais notado quando esta ave se desloca em r.





Toutin-gre




Trata-se de uma das mais abundantes
toutin-gres da nossa avifauna.
Apresenta a cabeça preta, no caso dos
machos, garganta branca e um visível anel
overmellado. As fêmeas são mais abast-
-das na cabeça e menos escuras no dorso.
A cauda é ligeiramente empinada, facto
notado quando esta ave se desloca e
voo.

mais, uma coisa

Fim

Esta espécie existe especialmente no norte
do país, o seu canto melodioso é um
dos sons mais característicos do
e jardins. urbanos. Barrete preto nos
machos e castanho nas fêmeas.















Tentilhão

Muito comum em zonas florestais.
Costuma alimentar-se no solo, principal-
mente de sementes.

Os outros e no inverno forma grandes ban-
dos com outras fringilídeos, a família de aves
constitua por 138 espécies. As aves desta família
são essencialmente granívoras.



Toutinegro de -

